***RET*-ALTERIERTE TUMOREN**

Retsvemo® (Selpercatinib) bei bestimmten Krebsarten[1,2]

PatientInnen, deren Lungen- oder Schilddrüsenkarzinome den Biomarker *RET* aufweisen, können nun mit einem Tyrosinkinaseinhibitor zielgerichtet behandelt werden[3,4]

Ab 1. Mai 2021 ist die Beratungsaktion „Retsevmo® bei bestimmten *RET*-alterierten Tumoren" freigeschalten. Retsevmo® wird nach Körpergewicht dosiert (Startdosis bei 50 kg Körpergewicht oder mehr: 160 mg / 2 x täglich, Startdosis bei Körpergewicht unter 50 kg: 120 mg / 2 x täglich) und ist in zwei Wirkstärken (80 mg Flasche zu 60 Stück, PZN 4987003 und 40 mg Flasche zu 60 Stück, PZN 4986995) verfügbar.

Um Patienten bei der korrekten Einnahme des Krebsmedikaments zu unterstützen, werden Hinweise in der AVS Software als Beratungsaktion angeboten. Damit stehen wichtige Hinweise am point of contact mit dem Patienten zur Verfügung und tragen so zur Patientensicherheit bei. Bitte geben Sie diese Information an Ihre Retsevmo®-Patienten weiter!

1 Fachinformation Retsevmo® 40 [80] mg Hartkapseln. Austria Codex. Stand der Information: Februar 2021
2 Dieses Arzneimittel wurde unter „Besonderen Bedingungen" zugelassen. Das bedeutet, dass weitere Nachweise für den Nutzen des Arzneimittels erwartet werden.
3 Drilon A, Oxnard GR, Tan DSW, et al. N Engl J Med 2020; 383: 813-24
4 Wirth LJ, Sherman E, Robinson B., et al. N Engl J Med 2020; 383: 825-835
5 Gebrauchsinformation Retsevmo® 40 [80] mg Hartkapseln. Austria Codex. Stand der Information: Februar 2021
6 Gelbe Liste Pharmindex. Internet: https://www.gelbe-liste.de/arzneimitteltherapiesicherheit/cyp-interaktionen/cyp3a4 Datum des Zugriffs: 26.03.2021

Scannen Sie den QR-Code um alles über Retsevmo® zu erfahren!

WICHTIGE HINWEISE FÜR IHRE BERATUNG AN DER TARA[1,5]

- Die Kapseln können mit oder ohne Nahrung eingenommen werden.
- Die Kapseln im Ganzen (nicht öffnen, zerbrechen oder kauen) mit einem Glas Wasser schlucken.
- Retsevmo® 2 x täglich ungefähr zur gleichen Uhrzeit einnehmen, vorzugsweise am Morgen und am Abend.
- Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem Protonenpumpen-Inhibitor: Retsevmo® muss mit Nahrung eingenommen werden.
- Bei gleichzeitiger Behandlung mit einem H2-Rezeptor-Antagonist: Retsevmo® sollte 2 Stunden vor oder 10 Stunden nach der Einnahme des H2-Rezeptor-Antagonisten verabreicht werden.
- Die gleichzeitige Einnahme anderer Medikamente (mit und ohne Verschreibung, auch z. B. Johanniskraut) ist mit dem behandelnden Arzt abzusprechen.
- Retsevmo® wird über das Leberenzym CYP3A4 metabolisiert. Deshalb können andere Arzneimittel, oder auch Speisen oder Getränke mit Grapefruitsaft, die Pharmakokinetik von Retsevmo® verändern.[1,6]

PP-SE-AT-0071 / 04.2021