

Arzneimittel / Nahrungsergänzungsmittel	Hinweis	Haltbarkeit	Lagerung	Zusatzinformation
Abavalex 10 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	10 Monate	< 25 °C	
Abilify 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Abilify 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Abacus)	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Abilify 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Eurim)	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Abilify 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Orifarm)	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Acetolyt - Granulat	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 30 °C	Dose fest verschlossen halten.
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Acetylcystein Hexal 200 mg - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Acetylcystein Hexal 100 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Acetylcystein Hexal 600 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Acidum formicicum Sanum - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	
Adcirca 2 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	110 Tage	< 25 °C	
Adempas 0,15 mg/ml - Gran z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	14 Tage	< 30 °C	Nicht einfrieren. Aufrecht lagern.
Adol spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Adolorin Ibutorte direkt 400 mg - Susp z.Einn.	nach Anbruch	sofort einnehmen		Vor dem Öffnen den Beutel durchkneten.
Adolorini direkt 200 mg - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	sofort einnehmen		Vor dem Öffnen den Beutel durchkneten.
Aerius 0,5 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Bei Veränderung des Aussehens der Lösung, nicht einnehmen. Nicht einfrieren.
Aeromuc 600 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Aflubin - Grippetropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Schwankungen im Geruch sowie leichte Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität oder Wirksamkeit.
Aflubin - Hals- und Rachentropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Schwankungen im Geruch sowie leichte Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität oder Wirksamkeit.
Agaffin - Abführgel	nach Anbruch der Aluminiumtube	2 Wochen	< 25 °C	
	nach Anbruch der Kunststoffflasche	8 Wochen	< 25 °C	
Agamree 40 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	2 - 8 °C	Aufrecht stehend im Kühlschrank lagern.
Agiolax - Granulat	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Ailgeno spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Aktivanad Flüssig Dr. Fischer - Tonikum	nach Anbruch	3 Monate	8 - 15 °C	
Akutur spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Albicansan D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Nicht mehr verwenden, wenn die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht.
Alcover - Sirup	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	

Alka-Seltzer - Brausetabletten	nach Öffnen der Folie	sofort einnehmen		
Allergon - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Alpinamed Curcuma forte - Liquid	nach Anbruch	ganze Laufzeit	15 - 25 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Alpinamed Hustenlöser - Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch gut schütteln. Eintrübungen beeinträchtigen nicht die Qualität.
Alpinamed Hustenlöser - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln. Auftretende Trübungen beeinträchtigen nicht die Qualität.
Alpinamed Hustenreizlinderer Eibisch-Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln. Auftretende Trübungen beeinträchtigen nicht die Qualität.
Alpinamed Passelyt Beruhigungstropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln. Auftretende Trübungen beeinträchtigen nicht die Qualität.
Alpinamed Preiselbeer - Trink-Konzentrat	nach Anbruch	3 Monate	2 - 8 °C	
Alveofact 45 mg/ml - Plv+Lsgm z.H.e. Susp z.endotracheopulm. Instillation	nach Zubereitung	6 Stunden	< 25 °C	Gelöstes Arzneimittel sofort verwenden. Bei nicht sofortiger Verwendung siehe Fachinformation.
	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Gelöstes Arzneimittel sofort verwenden. Bei nicht sofortiger Verwendung siehe Fachinformation.
Amara - Tropfen Weleda z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Eintrübungen beeinträchtigen die Qualität nicht.
Ambrobene 15 mg/5 ml - Saft	nach Anbruch	2 Wochen	< 25 °C	
Ambrobene 7,5 mg/ml - Lösung	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Ambrohexal 7,5 mg/ml - Lösung	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ambroxol 1A Pharma 7,5 mg/ml - Lösung	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ambroxol Genericon - Lösung	nach Anbruch	28 Tage	< 25 °C	
Ambroxol Genericon 60 mg - Tabletten löslich	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 30 °C	Röhrchen sofort nach Gebrauch fest verschließen bis der Deckel deutlich einrastet.
Amglidia 0,6 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	30 Tage	< 25 °C	
Amglidia 6 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	30 Tage	< 25 °C	
Ammonaps 940 mg/g - Granulat	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Ammonaps 940 mg/g - Granulat (Par.Abacus)	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Ampho-Moronal - Suspension	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Amversio 1 g - Plv z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Anfokali - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Angin Heel - Halsspray	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Angina-Gastreu R1 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Antibiophilus - Plv z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Keine heißen Getränke verwenden. Geöffnete Beutel rasch verbrauchen und nicht lagern.
Antiflat - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Apo-RHEUM spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Akne Sulfur complex Nr.1 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Allergie Acidum formicicum complex Nr.2 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Antitranspirant Sambucus nigra complex Nr.3 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Appetit Abrotanum complex Nr.4 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Arteriosklerose Arnica complex Nr.5 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Bandscheiben- u.Gelenk Bryonia complex Nr.6 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	

Apozema Blasen- und Nieren Belladonna complex Nr.9 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Bluthochdruck Crataegus complex Nr.10 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Blutniederdruck Kalium carbonicum complex Nr.11 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Bronchial u.Husten Grindelia complex Nr.12 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Erschöpfung Phosphorus complex Nr.14 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Frauen Secale cornutum complex Nr.15 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Gastritis Argentum nitricum complex Nr.16 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Gedächtnis- u.Konzent. Glonoinum complex Nr.17 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Haarausfall Graphites complex Nr.39 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Herz- u.Kreislauf Camphora complex Nr.18 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Heuschnupfen Luffa complex Nr.19 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Ischias Rhus toxicodendron complex Nr.20 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Leber u.Galle Carduus marianus complex Nr.21 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Magen u.Darm Nux vomica complex Nr.37 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Migräne Gelsemium complex Nr.22 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Mund u.Zahnfleisch Echinacea complex Nr.23 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Nervenschmerzen Colocynthis complex Nr.24 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Prostata Sabal serrulatum complex Nr.25 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Psoriasis Thuja complex Nr.40 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Reizblasen Cantharis complex Nr.26 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Schlaf u.Durchschlaf Passiflora incarnata complex Nr.27 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Schnupfen und Grippe Aconitum complex Nr.28 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Schulte Acidum phosphoricum complex Nr.29 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Schwindel u.Kreislauf Cocculus complex Nr.30 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Sinusitis Kalium bichromicum complex Nr.31 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Stärkung f.Männer Ginseng complex Nr.32 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Stimmungsaufhellung Ignatia complex Nr.13 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Stress u.Nerven Lycopus virginicus complex Nr.33 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Stuhlregulung Magnesium chloratum complex Nr.34 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Venen Aesculus complex Nr.35 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apozema Wechseljahre Lachesis complex Nr.36 - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Apulo spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Artischocken - Tonikum	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	

Artischocken-Bitter ohne Alkohol Salus - Tonikum	nach Anbruch	4 Wochen	8 - 15 °C	Aufrecht lagern.
Ashwagandha Neuro Balance Bio - Tonikum	nach Anbruch	4 Wochen	8 - 15 °C	Aufrecht lagern.
Aspirin Akut 500 mg - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Aspirin Complex 500 mg/30 mg - Gran z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Aspirin Complex Heißgetränk 500 mg/30 mg - Gran z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung.	sofort einnehmen		Das Granulat löst sich nicht vollständig auf.
Aspirin+C - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Aspirin+C forte 800 mg/480 mg - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Asto spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Atma - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit		Schwankungen im Geruch sowie leichte Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität und Wirksamkeit.
Atustro spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Aufbaukalk 1 Weleda - Plv z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Aufbaukalk 2 Weleda - Plv z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Axura 5 mg/Pumpenhub - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Flasche mit aufgeschraubter Pumpe nur in aufrechter Position lagern oder transportieren.
Azomyr 0,5 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit		Nicht einfrieren.
Baraclude 0,05 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 30 °C	Das Arzneimittel darf nicht mit Wasser, anderen Lösungsmitteln oder Arzneimitteln gemischt werden.
Ben-u-ron - Saft	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Bericard - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Betadona - Mund-Antiseptikum	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Betmiga 8 mg/ml - Gran z.Herst.e. Retardsusp z.Einn.	nach Zubereitung	28 Tage	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren
Betnesol - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Biochemie nach Dr. Schüßler Die heiße Sieben Adler Pharma - Plv z.H.e. Lsg	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Biomont plus Dr. Fischer - Elixier	nach Anbruch	3 Monate	8 - 15 °C	
Bosentan Accord 32 mg - Tabl z.Herst.e.Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Die verbleibenden Teile der geteilten Tablette können bei Raumtemperatur aufbewahrt und innerhalb von 7 Tagen verwendet werden.
Boxagrippal Erkältungssaft 200 mg/10 ml + 30 mg/10 ml - Susp z.Einn.	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Brintellix 20 mg/ml - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	
Brivaracetam Genericon 10 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	10 Monate	< 25 °C	
Briviact 10 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Monate	< 25 °C	
Bronchial-Gastreu R9 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Bronchipret Duo - Hustensirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Bronchipret Duo Hustenlöser - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Bronchipret Thymian Efeu - Hustensirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Bronchipret Thymian Efeu - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Leichte Trübung oder Ausflockung beeinträchtigt nicht die Qualität.
Bronchipret Thymian Efeu - Saft	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Bronchostop - Erkältungssaft	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Bronchostop - Hustensaft	nach Anbruch	4 Wochen	< 25 °C	Ausflockungen (Bodensatz bzw. Ablagerungen am Schraubverschluss) haben keinerlei Einfluss auf die Wirksamkeit oder Qualität.

Bronchostop Bronchitis akut - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	12 Wochen	< 25 °C	Trübung, Ausflockung und Farbveränderung beeinträchtigen nicht die Qualität.
Bronchostop direkt - Hals- und Rachenspray	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	
Bronchostop Guaifenesin 10% akut - Hustentropfen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	
Bronchostop sine - Hustensaft	nach Anbruch	4 Wochen	< 25 °C	
Bronchoverde Hustenlöser 50 mg - Brausetabletten	nach Anbruch des Röhrchens	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Bronchoverde Hustenlöser 100 mg - Brausetabletten	nach Anbruch des Röhrchens	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Bropert spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Buccolam 2,5 mg - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Buccolam 5 mg - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Buccolam 7,5 mg - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Buccolam 10 mg - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Buconif 5 mg - Sublingualspray	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Nicht Schütteln vor Gebrauch.
Buerlecithin - flüssig	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Calcium Sandoz 500 mg - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Calmedoron - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln. Auftretende Trübungen beeinträchtigen nicht die Qualität.
Calmvalera Hevert - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Canephron - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Carbaglu 200 mg - Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Nicht kühlen.
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Cardiodoron - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Carglumsäure Waymade 200 mg - Tabl z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Cassella-med Thymian Isländ. Moos Hustensaft f.Kind u.Jugend. - Sirup	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Cefavora - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Ce-Limo Orange - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Ce-Limo Zitrone - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Celsentri 20 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	60 Tage	< 30 °C	
Ceolat 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Certican 0,25 mg - Tabletten z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Anbruch	sofort einnehmen		
China-Öl - Tropfen	nach Anbruch	2 Jahre	< 25 °C	Flasche im Umkarton aufbewahren (Lichtschutz).
Chlorhexamed 1% - Gel z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Chlorhexamed Fluid 0,1%	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Chlorhexamed Forte 2 mg/ml - Dental-Lsg z.Anw. Zahnarztpraxis	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Chlorhexamed Forte alkoholfrei 2 mg/ml - Lsg z.Anw. Mundhöhle	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Choleodoron - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln.

Circuvin - Kreislauftropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Citrafleet - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Clauparest spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Clavamox 1 g - Granulat z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Co-HYPERT spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Colecalciferol Fresenius 14400 I.E./ml - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	10 Monate	< 25 °C	
Combantrin 250 mg/5 ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Convulex 50 mg/ml f.Kinder - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Convulex 300 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Cora Herz- und Kreislauftropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Corasan - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Cralonin - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Cranagil Föhn- und Wettertropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Crataegan - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nachtrübungen oder leichte Schwankungen in Farbe bzw. Geschmack, beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit.
Crataegutt - Flüssigkeit z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nachtrübungen oder leichte Schwankungen in Farbe bzw. Geschmack, beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit.
Crimax - Haarvitaltropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Cutro spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Cynarix liquid - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch gut schütteln.
Cystadane 1 g - Plv z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Einnahme erst wenn vollständig gelöst.
Cystium 3 g - Plv z.H.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Cysto-Gastreu R18 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
D3 1000 IE Solarvit - Tropfen	nach Anbruch	10 Monate	< 25 °C	Lichtschutz.
D3 K2 Solarvit - Tropfen	nach Anbruch	10 Monate	< 25 °C	Lichtschutz.
Daktarin 2% - orales Gel	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	
Dalektro - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Darm-Care Curcuma Bioaktiv Salus - Tonikum	nach Anbruch	4 Wochen	2 - 8 °C	Aufrecht lagern.
Deas spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Defendyt Immunoglukan - Sirup	nach Anbruch	3 Monate	2 - 8 °C	
Dekristolmin 20000 I.E./ml - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Deltyba 25 mg - Tabletten z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dentinox - Gel Zahnnungshilfe	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Depakine 300 mg/ml - Tropfen	nach Anbruch	60 Tage	< 25 °C	
Dequonal - Lösung	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Deseo - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Desloratadin Aristo 0,5 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 30 °C	Nicht verwenden, wenn eine Veränderung des Aussehens der Lösung bemerkt wird.
Diacomit 250 mg - Plv z.H.e. Susp z.Einn. im Beutel	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Diacomit 500 mg - Plv z.H.e. Susp z.Einn. im Beutel	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Diarrhoesan - Saft	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	

Dibondrin - liquid	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Diclofenac Sandoz rapid 50 mg- Tabl z.H.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Digestodoron - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Diluplex - Tropfen bei Nervenschmerzen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Diovan 3 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	
Doppelherz Herz-Kreislauf - Tonikum	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Doppelherz Herz-Kreislauf alkohol- u.zuckerfrei - Tonikum	nach Anbruch	3 Monate	2 - 8 °C	
Doxybene 100 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung (in einem Glas Wasser gelöst)	sofort einnehmen		
Doxybene 200 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung (in einem Glas Wasser gelöst)	sofort einnehmen		
Doxycyclin G.L. 100 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Doxycyclin G.L. 200 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Doxycyclin Genericon 100 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Doxycyclin Genericon 200 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dr. Böhm Cranberry akut - Brausegranulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dr. Böhm Gelenks complex intensiv Himbeere - Brausegranulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dr. Böhm Gelenks complex intensiv Mango - Brausegranulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dr. Böhm Immun Elixier - Trinkpulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dr. Böhm Leistungselixier - Brausegranulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dr. Böhm Magen-Darm - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Dr. Böhm Magnesium complex - Brausegranulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dr. Böhm Magnesium Sport - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dr. Böhm Magnesium Sport + Aminosäuren - Brausegranulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Dropizol 10 mg/ml - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	4 Wochen	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Dukoral - Susp + Brausepulver z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	2 Stunden	< 25 °C	
Duvyzat 8,86 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	60 Tage	< 25 °C	Suspension mind. 30 Sek. lang durch ca. 40-maliges Drehen der Flasche um 180° schütteln, Homogenität visuell überprüfen. Nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten verdünnen.
Dynexan 1,8% - Mundgel	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Easyangin - Spray z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Easybronchial - Thymian Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Easybronchial STOP FORTE 3 mg/ml - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Easybronchial STOP JUNIOR 1,5 mg/ml - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Ebixa - Lsg z.Einnehmen 5 mg/Pumpenhub	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Flasche mit aufgeschraubter Pumpe darf nur in aufrechter Position gelagert und transportiert werden.
Echinacin Madaus - Flüssigkeit z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	

Echinacin Madaus - Saft	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	
Echinaforce - Tropfen	nach Anbruch	4 Monate	< 25 °C	Schwache Trübungen oder ein geringer Bodensatz beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit.
Edurant 2,5 mg - Tabletten z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Efeu DoppelherzPharma Hustenlöser - Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Effortil 7,5 mg/ml - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Eliquis 0,15 mg - Granulat in Kapseln z.Öffnen	nach Zubereitung mit Wasser oder Babynahrung	2 Stunden	< 25 °C	
Eliquis 0,5 mg - überzogenes Granulat im Beutel	nach Zubereitung mit Wasser, Apfelsaft oder Babynahrung	2 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung mit Apfelmus	sofort einnehmen		
Eliquis 1,5 mg - überzogenes Granulat im Beutel	nach Zubereitung mit Wasser, Apfelsaft oder Babynahrung	2 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung mit Apfelmus	sofort einnehmen		
Eliquis 2 mg - überzogenes Granulat im Beutel	nach Zubereitung mit Wasser, Apfelsaft oder Babynahrung	2 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung mit Apfelmus	sofort einnehmen		
Emcitate 350 µg - Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	4 Stunden	< 25 °C	Nur Trinkwasser verwenden. Nach Lagerung vor der Anwendung unter Rühren 1 Minute lang mit einem Teelöffel erneut auflösen.
Emend 125 mg - Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	3 Stunden	< 30 °C	
	nach Zubereitung	72 Stunden	2 - 8 °C	
Emtriva 10 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	45 Tage	< 25 °C	
Endofalk - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	3 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung	48 Stunden	2 - 8 °C	Gebrauchsfertige Lösung kann zum Abkühlen in den Kühlschrank gestellt werden, da die gekühlte Lösung angenehmer zu trinken ist.
Ennos 33,1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	56 Tage	< 25 °C	
Epclusa 150 mg/37,5 mg - befilmtes Granulat im Beutel	nach Zubereitung	15 Minuten	< 25 °C	Nicht kauen, um einen bitteren Geschmack zu vermeiden.
Epclusa 200 mg/50 mg - befilmtes Granulat im Beutel	nach Zubereitung	15 Minuten	< 25 °C	Nicht kauen, um einen bitteren Geschmack zu vermeiden.
Epidyolex 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	12 Wochen	< 25 °C	
Epidyolex 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Abacus)	nach Anbruch	12 Wochen	< 25 °C	
Epidyolex 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Orifarm)	nach Anbruch	12 Wochen	< 25 °C	
Epistatus 2,5 mg - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	sofort einnehmen		Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Epistatus 5 mg - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	sofort einnehmen		Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Epistatus 7,5 mg - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	sofort einnehmen		Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Epistatus 10 mg - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	sofort einnehmen		Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Epivir 10 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	
Erdomed 225 mg - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Erysidoron Nr.1 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Esto-gast - Flüssigkeit z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Ethosuximid neuraxpharm 50 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	

Eusaprim - orale Susp f.Kinder	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
<i>Euviril Direkt N - Brausetabletten</i>	<i>nach Zubereitung</i>	<i>sofort einnehmen</i>		
Exelon 2 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Monat	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Aufrecht stehend aufbewahren.
Exmykehl D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht mehr verwenden.
Ezmekly 1 mg - Tabletten z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	6 Stunden	< 30 °C	
<i>Feldthymian - Kräutersaft</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>3 Monate</i>	< 25 °C	
<i>Femannose P ProDuo - Beutel</i>	<i>nach Zubereitung</i>	<i>sofort einnehmen</i>		
Fenistil - Tropfen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Feriprox 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	35 Tage	< 30 °C	
Finlee 10 mg - Tabletten z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	30 Minuten		Die Lösung wird trüb-weiß sein, wenn sie fertig zubereitet ist.
Fintepla 2,2 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
<i>Floradix Eisen B12 vegan - Tonikum</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>3 Wochen</i>	<i>8 - 15 °C</i>	
<i>Floradix Eisen für Kinder - Tonikum</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>8 - 15 °C</i>	
<i>Floradix Eisen Sport - Tonikum</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>8 - 15 °C</i>	
<i>Floradix Kindervital - Tonikum</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>4 Wochen</i>	<i>8 - 15 °C</i>	
Fluimucil 200 mg - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Fluimucil 600 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Forlax 4 g - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Forlax 10 g - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Fortakehl D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Fosfomycin Eberth 3 g - Granulat z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Fycompa 0,5 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	90 Tage	< 25 °C	
Fycompa 0,5 mg/ml - Susp z.Einnehmen (Par.Orifarm)	nach Anbruch	90 Tage	< 25 °C	
Galium-Heel - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Galstena - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Gastrografin - Röntgenkontrastm. z.oral. u.rekt. Anw.	nach Anbruch	72 Stunden	< 25 °C	
GastroMed Madaus - Tropfen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Ausflockungen oder Trübungen sind ohne Einfluss auf die Wirksamkeit.
Gastromiro nichtionisches Röntgenkontrastmittel - enter. Lsg	nach Anbruch	sofort verwenden		
Gaviscon Dual Mint 500 mg/213 mg/325 mg - Susp z.Einn. Btl	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Gaviscon Dual Waldfrucht 500 mg/213 mg/325 mg - Susp z.Einn. Btl	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Gaviscon Liquid forte Anis 100 mg/ml + 20 mg/ml - Susp z.Einn.	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Vor Gebrauch gut schütteln.
Gaviscon Liquid Mint - Susp z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Vor Gebrauch gut schütteln.
Gaviscon Liquid Mint - Susp z.Einn. Sachets	nach Anbruch	sofort einnehmen		Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Gelenk Albin - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Gentos - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Schwankungen im Geruch und Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität bzw. Wirksamkeit.
Gerolamic 5 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		

Gerolamic 25 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Gerolamic 50 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Gerolamic 100 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Gerolamic 200 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Gerovit D3 14400 IE/ml - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Gerovit D3 28800 IE/ml - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Ghryvelin 60 mg - Gran z.Herst.e. Susp z.Einn. i.e. Btl	nach Zubereitung	30 Minuten	2 - 8 °C	Suspension umrühren, bis sie leicht trübe ist und sich keine Partikel mehr am Boden des Behälters befinden.
<i>Ginkgo Lecithin plus Dr. Fischer - Tonikum</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>3 Monate</i>	<i>8 - 15 °C</i>	
Glandosane synthetischer Speichel - Aerosol	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Vor Erwärmung über 50 °C (z.B. Sonnenbestrahlung) schützen – Behältnis steht unter Druck.
Gliolan 30 mg/ml - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	24 Stunden	< 25 °C	
Glycoplant Urtinktur - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
<i>Gojisan Immun Protect - Saft</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>8 Wochen</i>	<i>< 25 °C</i>	
Granupas 4 g - magensaftresistentes Granulat	nach Anbruch des Beutels	24 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Vor Gebrauch umrühren (Granulat löst sich nicht auf). In einem Zug austrinken und Granulat dabei nicht zerkauen.
Grifokehl D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Gripagil - Grippetropfen mit Echinacea	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Grippostad akut ASS/Pseudoeph. 500 mg/30 mg - Gran z.H. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Grippostad Ambroxol Schleimlöser 30 mg/5 ml - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Grippostad C forte - Gran z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Grippostad GUAIFENESIN 100 mg/ml - Hustentropfen z.Einn.	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Grippostad Heißgetränk - Pulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Gutron 1 % - Tropfen	nach Anbruch	4 Monate	< 25 °C	
Guttalax - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 30 °C	
Habifac spag. Peka - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Haemex - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Haldol 2 mg/ml- Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Harvoni 33,75 mg/150 mg - befilmtes Granulat im Beutel	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Nicht kauen, um einen bitteren Geschmack zu vermeiden.
Harvoni 45 mg/200 mg - befilmtes Granulat im Beutel	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Nicht kauen, um einen bitteren Geschmack zu vermeiden.
Hechocur spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Hedelix - Brausetabletten	nach Anbruch des Röhrchens	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Hedussin - Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch gut schütteln.
Hedussin - Sirup Fruchtgeschmack	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch gut schütteln.
Helicobacter Test INFAI 75 mg - Plv z.H.e. Lsg z.Einn. (IRMS)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Helicobacter Test INFAI 75 mg - Plv z.H.e. Lsg z.Einn. (NDIR od.IRMS)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Helicobacter Test INFAI 75 mg - Plv z.H.e. Lsg z.Einn. (NDIR)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		

Helicobacter Test INFAI f.Kinder v.3-11, 45 mg - Plv z.H.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Hemangiol 3,75 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Flasche vor der Anwendung nicht schütteln. Flasche und Oralspritze nach jeder Anwendung in dem Umkarton aufbewahren. Nicht einfrieren.
	nach Zubereitung	2 Stunden	< 25 °C	Flasche vor der Anwendung nicht schütteln. Flasche und Oralspritze nach jeder Anwendung in dem Umkarton aufbewahren. Nicht einfrieren.
Hemangiol 3,75 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Abacus)	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Flasche vor der Anwendung nicht schütteln. Flasche und Oralspritze nach jeder Anwendung in dem Umkarton aufbewahren. Nicht einfrieren.
	nach Zubereitung	2 Stunden	< 25 °C	Flasche vor der Anwendung nicht schütteln. Flasche und Oralspritze nach jeder Anwendung in dem Umkarton aufbewahren. Nicht einfrieren.
Hepa-Gastreu R7 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Hepa-Merz 3 g - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Hepasan 5 g - Brausepulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Herbion Efeu 7 mg/ml - Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Hexoral - Lösung z.Gurgeln	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	Nicht einfrieren. Die Flasche im Umkarton aufbewahren (Lichtschutz). Kleine punktförmige Ablagerungen an der Flaschenwand können auftreten, haben jedoch keinen Einfluss auf die Wirksamkeit und Verträglichkeit.
Hidrasec 10 mg - Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Hidrasec 30 mg - Gran z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Ho-Len-Complex Chole-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ho-Len-Complex Conva-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ho-Len-Complex Cysto-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ho-Len-Complex Febro-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ho-Len-Complex Fuco-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ho-Len-Complex Neuri-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ho-Len-Complex Oto-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ho-Len-Complex Plexus-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ho-Len-Complex Thyreo-cyl - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Husten ACC Hexal akut 200 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Die lösbaren Tabletten sollten nicht gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln aufgelöst werden.
Husten ACC Hexal akut 600 mg - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Hustensaft - Weleda	nach Anbruch	2 Wochen	2 - 8 °C	
Hylak forte - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Leichte Trübung der Lösung ist unbedeutend und hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.
Hypericum Auro cultum, Herba Weleda - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Iberogast BALANCE - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Vor Gebrauch gut schütteln.
Iberogast CLASSIC - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Ausflockungen oder Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität.
Iberogast SELECT - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Vor Gebrauch gut schütteln.
Ibuakut 400 mg - Granulat z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Ibuprofen Nutra Essential 20 mg/ml - Susp z.Einn.	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln

Ibuprofen Nutra Essential 100 mg - Susp z.Einn.	nach Anbruch	sofort einnehmen		Vor dem Öffnen den Beutel durchkneten.
Ibuprofen ratiopharm 4% - Sirup f.Kinder	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Immun-Kräuter Bio Salus Alpenkraft - Tonikum	nach Anbruch	4 Wochen	2 - 8 °C	
Imosec 0,2 mg/ml - Lösung z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
InfectoDexaKrupp 2 mg/5 ml - Saft	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht verwenden, wenn die Lösung trüb ist.
Influbene Erkältungsgetränk - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	90 Minuten	< 25 °C	
Infludo - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Infragil spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Inovelon 40 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	90 Tage	< 25 °C	Suspension nicht mehr verwenden, wenn eine Veränderung des Aussehens oder des Geruchs auftritt.
Irenat - Tropfen	nach Anbruch	12 Wochen	< 25 °C	
Isentress 100 mg - Granulat z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	30 Minuten	< 30 °C	
Itires spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ivypan plus - Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Jakavi 5 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	60 Tage	< 30 °C	
Japanisches Minzöl Klosterfrau	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Japomin Öl - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Jayempi 10 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	12 Wochen	< 25 °C	Flasche vor Gebrauch schütteln.
Jylamvo 2 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Kaftrio 60 mg/40 mg/80 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kaftrio 75 mg/50 mg/100 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kaletra 80 mg + 20 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Wochen	< 25 °C	
Kalioral "Fresenius" - Pulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Kaloba - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Kaloba - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	Nachtrübungen oder leichte Schwankungen in Farbe bzw. Geschmack beeinträchtigen nicht die Qualität.
Kalydeco 13,4 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kalydeco 25 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kalydeco 50 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kalydeco 59,5 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kalydeco 75 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kalydeco 75 mg - Granulat im Beutel (Par.Abacus)	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kalydeco 75 mg - Granulat im Beutel (Par.Orifarm)	nach Zubereitung	1 Stunde		
Kamillosan - Flüssigkeit	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Natürliche Ausflockungen haben keinen Einfluss auf die Qualität.
Kamillosan - Mundspray	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Natürliche Trübungen haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit. Bei Verstopfung des Sprührohres, kurz unter warmes Wasser halten.
Keppra 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	
Keppra 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Abacus)	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	
Keppra 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Eurim)	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	
Keppra 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen (Par.Haemato)	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	
Kettese 25 mg - Granulat z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	unverzüglich einnehmen		
Kettese 25 mg - Lsg z.Einnehmen im Beutel	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Kigabeq 100 mg - Tabletten z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Anbruch	100 Tage	< 25 °C	

	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Die zubereitete Lösung ist weißlich und trüb aufgrund nicht-wasserlöslicher sonstiger Bestandteile.
Kigabeq 500 mg - Tabletten z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Anbruch	100 Tage	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Die zubereitete Lösung ist weißlich und trüb aufgrund nicht-wasserlöslicher sonstiger Bestandteile.
Klean-Prep - Pulver	nach Anbruch	48 Stunden	2 - 8 °C	
Klimax-Gastreu R10 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Klosterfrau Melisengeist - Flüssigkeit z.Einn. + z.Anw. a.d. Haut	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Klosterfrau Spitzwegerich - Hustensaft	nach Anbruch	6 Wochen	< 25 °C	
Klosterfrau Thymian Isländisch Moos - Hustensaft	nach Anbruch	2 Wochen	< 25 °C	
Klosterfrau Thymian Isländisch Moos Hustensaft f.Kinder u.Jugendl. - Sirup	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Korodin Herz-Kreislauf - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Kreon - Granulat Micro	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Kuvan - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen 100 mg	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	
Kuvan - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen 500 mg	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	
Kuvan - Tabletten z.Herst.e. Lsg z.Einn. 100 mg	nach Zubereitung	20 Minuten	< 25 °C	Die Tabletten können zerkleinert werden (beschleunigt die Auflösung). Kleine sichtbare Teilchen beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit. Innerhalb von 15 bis 20 Min. trinken.
Kuvan - Tabletten z.Herst.e. Lsg z.Einn. 100 mg (Par.Abacus)	nach Zubereitung	20 Minuten	< 25 °C	Die Tabletten können zerkleinert werden (beschleunigt die Auflösung). Kleine sichtbare Teilchen beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit. Innerhalb von 15 bis 20 Min. trinken.
Kuvan - Tabletten z.Herst.e. Lsg z.Einn. 100 mg (Par.Orifarm)	nach Zubereitung	20 Minuten	< 25 °C	Die Tabletten können zerkleinert werden (beschleunigt die Auflösung). Kleine sichtbare Teilchen beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit. Innerhalb von 15 bis 20 Min. trinken.
Kuvan - Tabletten z.Herst.e. Lsg z.Einn. 100 mg (Par.Synco)	nach Zubereitung	20 Minuten	< 25 °C	Die Tabletten können zerkleinert werden (beschleunigt die Auflösung). Kleine sichtbare Teilchen beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit. Innerhalb von 15 bis 20 Min. trinken.
Kwizda Thymian Eibisch - Hustensaft	nach Anbruch	4 Wochen	< 25 °C	Ausflockungen, Ausfällungen und Trübungen beeinträchtigen nicht die Qualität des Produktes.
Lacopat 10 mg/ml - Sirup	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Lacosamid UCB 10 mg/ml - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern.
Lactat-oral "Wabo" - flüssig, Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	
Lactisol liquidum GPH - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Lactulose Genericon Konzentrat - orale Lösung	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Lactulose Hexal 670 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Lactulose MIP 650 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Laevogo Pflaumenaroma 10 g/15 ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Laevolac 10 g - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Laevolac 10 g/15 ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Laevolac Lactulose Konzentrat - orale Lösung	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Laevolac Pflaumenaroma 667 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 30 °C	
Lamotrigin 1A Pharma 25 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin 1A Pharma 50 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin 1A Pharma 100 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		

Lamotrigin 1A Pharma 200 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin ratiopharm GmbH 25 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin ratiopharm GmbH 50 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin ratiopharm GmbH 100 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin ratiopharm GmbH 100 mg - lösliche Tabletten (Par.P1)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin ratiopharm GmbH 200 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung in wenig Wasser	sofort einnehmen		
Lamotrigin Sandoz GmbH 25 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin Sandoz GmbH 50 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin Sandoz GmbH 100 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin Sandoz GmbH 200 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin Stada 25 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin Stada 50 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin Stada 100 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lamotrigin Stada 200 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Latensin D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Laxasan - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Laxogol - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Gebrauchsfertige Lösung zugedeckt lagern.
L-Carnitin Fresenius - orale Lösung	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Leaton complete - Tonikum	nach Anbruch	1 Monat	8 - 15 °C	
Leaton Multivitamin classic für Erwachsene - Tonikum	nach Anbruch	1 Monat	8 - 15 °C	
Leaton Multivitamin sine für Erwachsene - Tonikum	nach Anbruch	1 Monat	8 - 15 °C	
Lefax 41,2 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	13 Wochen	< 25 °C	
Lefisyo 5 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch (100 ml, 500 ml oder 1000 ml)	90 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch (10 ml)	28 Tage	< 25 °C	
	verdünnt mit Fruchtsaft (wie z. B. Orangensaft oder Himbeersirup) oder mit Trinkwasser	7 Tage	< 25 °C	
	verdünnt mit Trinkwasser oder mit konservierten und dickflüssigen Verdünnungsmitteln	3 Monate	< 25 °C	
Lemocin Flurbiprofen 8,75 mg/Dosis - Spray z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	
Levebon 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Levetiracetam Accord 100 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	4 Monate	< 25 °C	
Levetiracetam Actavis Group 100 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	
Levetiracetam Aristo 100 mg/ml- Lsg z.Einn.	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Levetiracetam G.L. 100 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	

Levetiracetam ratiopharm 100 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	4 Monate	< 25 °C	
Levetiracetam Sandoz 100 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	
Levetiracetam Stada 100 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	
Levetiracetam UCB 100 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	
Levohelm 25 µg/5 ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	
Levohelm 50 µg/5 ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	
Levohelm 100 µg/5 ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	
Levo-Methasan 1 mg/ml - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Levo-Methasan 5 mg/ml - Konz z.H.e. Lsg z.Einn.	nach Anbruch der Flasche und eingesetzter Pipette	6 Monate	< 25 °C	
	mit konservierten und viskosen Verdünnungsmitteln in frei wählbaren Verdünnungsverhältnissen von bis zu 1:3 (1 Teil Konzentrat und bis zu 2 Teile Aqua purificata) verdünnt	3 Monate	< 25 °C	
	mit Wasser oder Fruchtsäften (ausgenommen Grapefruitsaft) in frei wählbaren Verhältnissen verdünnt	24 Stunden	< 25 °C	
Lisinopril Taw Pharma 1 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	30 Tage	< 25 °C	
Livmarli 9,5 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	130 Tage	< 30 °C	
Loesferron forte - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Lokelma 5 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Flüssigkeit trinken, solange sie noch trüb ist. Pulver löst sich nicht auf, falls es sich absetzt, gut umrühren und ev. mit weiterem Wasser Glas nachspülen.
Lokelma 5 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. (Par.Orifarm)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Flüssigkeit trinken, solange sie noch trüb ist. Pulver löst sich nicht auf, falls es sich absetzt, gut umrühren und ev. mit weiterem Wasser Glas nachspülen.
Lokelma 10 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Flüssigkeit trinken, solange sie noch trüb ist. Pulver löst sich nicht auf, falls es sich absetzt, gut umrühren und ev. mit weiterem Wasser Glas nachspülen.
Lokelma 10 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. (Par.Abacus)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Flüssigkeit trinken, solange sie noch trüb ist. Pulver löst sich nicht auf, falls es sich absetzt, gut umrühren und ev. mit weiterem Wasser Glas nachspülen.
Lokelma 10 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. (Par.Orifarm)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Flüssigkeit trinken, solange sie noch trüb ist. Pulver löst sich nicht auf, falls es sich absetzt, gut umrühren und ev. mit weiterem Wasser Glas nachspülen.
L-Polamidon - Lsg z.Substitution	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung (Take-home)	4 Wochen	< 25 °C	
Lupolac - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Luuf-Efeu - Brausetabletten	nach Anbruch des Behältnisses	6 Monate	< 25 °C	Röhrchen fest verschlossen halten.
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Luuf-Efeu - Hustensirup f.Kinder	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Lymphdiaral - Basistropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Trübungen und Ausflockungen können auftreten. In diesem Fall den Inhalt der Flasche kurz aufschütteln.

Lymphomyosot - Tropfen zum Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Lyricea 20 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Macrogol 4000 Strides 10 g - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einn. im Btl	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Macrogol 4000 Strides Junior 4 g - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einn. im Btl	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Madopar 100 mg/25 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	30 Minuten	< 30 °C	Fruchtsäften, Milch oder heiße Getränke sind nicht geeignet zum Auflösen. Da die milchig-flockige Lösung rasch sedimentiert, vor dem Trinken umrühren und sofort einnehmen.
Madopar 100 mg/25 mg - lösliche Tabletten (Par.P3)	nach Zubereitung	30 Minuten	< 30 °C	Fruchtsäften, Milch oder heiße Getränke sind nicht geeignet zum Auflösen. Da die milchig-flockige Lösung rasch sedimentiert, vor dem Trinken umrühren und sofort einnehmen.
Magnesiocard 5 mmol - Pulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Magnesiocard 7,5 mmol - Brausetabletten	nach dem ersten Öffnen des Röhrchens	2 Jahre	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Magnesiocard 10 mmol Orange - Pulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Magnesium Diasporal 300 mg - Gran z.Herst.e.Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Magnesium Diasporal 400 mg - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Magnesium Verla - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Magnonorm Genericon 365 mg - lösliche Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Magnosolv - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Marrubin Andorn - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Mastodynion - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Leichte Trübung oder Ausflockung beeinträchtigt nicht die Wirkung.
Maxi-Kalz 500 mg - Brausetabletten	nach Anbruch des Röhrchens	ganze Laufzeit	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Maxi-Kalz 1000 mg - Brausetabletten	nach Anbruch des Röhrchens	ganze Laufzeit	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Maxi-Kalz Vit.D3 1000 mg/880 I.E. - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Med-angin 1,5 mg/ml - Spray z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Med-angin 3 mg/ml - Spray z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Meditonsin - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Mellozzan 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Memantine Merz 5 mg/Pumphub - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	
Metagelan 500 mg/ml - Tropfen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Metakaveron - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Metasinusit - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Metasolidago - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Metavirulent - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Methadon G.L. 10 mg/ml - Konz z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Anbruch der Flasche (und eingesetzter Pipette bei 100 ml-500 ml)	6 Monate	< 25 °C	

	mit konservierten und viskosen Verdünnungsmitteln (in frei wählbaren Verdünnungsverhältnissen) oder gereinigtem Wasser (im Verhältnis bis zu 1:3, 1 Teil Konzentrat plus 2 Teile gereinigtes Wasser) verdünnt	3 Monate	< 25 °C	
	verdünnt mit Wasser oder Fruchtsäften	24 Stunden	< 25 °C	
Methasan 2 mg/ml - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Methasan 10 mg/ml - Konz z. Herst. e. Lsg z. Einn.	nach Anbruch der Flasche und eingesetzter Pipette	6 Monate	< 25 °C	
	mit konservierten und viskosen Verdünnungsmitteln (in frei wählbaren Verdünnungsverhältnissen) oder Aqua purificata (im Verhältnis bis zu 1:3, 1 Teil Konzentrat und bis zu 2 Teile Aqua purificata) verdünnt	3 Monate	< 25 °C	
	mit Wasser oder Fruchtsäften (ausgenommen Grapefruitsaft) in frei wählbaren Verhältnissen verdünnt	24 Stunden	< 25 °C	
Mexaratio 200 mg/5 ml - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Mexa-Vit C ratiopharm - Brausetabletten	nach Öffnen des Röhrchens	9 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Micropaque 1 g/ml - Susp z. oralen od. rekt. Anw.	nach Anbruch	15 Tage	< 25 °C	Nicht unter 5 °C. Nicht einfrieren. Flaschen liegend lagern.
Micropaque CT 50 mg/ml - Konz f. orale Susp	nach Anbruch	15 Tage	< 25 °C	Nicht einfrieren.
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Mimpara 1 mg - Granulat z. Entnahme aus Kapseln	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Zubereitung mit Wasser nicht empfohlen (bitterer Geschmack).
Mimpara 2,5 mg - Granulat z. Entnahme aus Kapseln	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Zubereitung mit Wasser nicht empfohlen (bitterer Geschmack).
Mimpara 5 mg - Granulat z. Entnahme aus Kapseln	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Zubereitung mit Wasser nicht empfohlen (bitterer Geschmack).
Misyo 10 mg/ml - Konz z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen	nach Anbruch	90 Tage	< 25 °C	
	nach Zubereitung	14 Tage	< 25 °C	In PET-Flasche vor Licht geschützt aufbewahren.
Modigraf 0,2 mg - Gran z. Herst. e. Susp z. Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Modigraf 1 mg - Gran z. Herst. e. Susp z. Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Modigraf 1 mg - Gran z. Herst. e. Susp z. Einn. (Par. Abacus)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Modigraf 1 mg - Gran z. Herst. e. Susp z. Einn. (Par. Orifarm)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Molaxole - Plv z. Herst. e. Lsg z. Einnehmen	nach Zubereitung	6 Stunden	2 - 8 °C	

Montana Hustropfen - Flüssigkeit z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Jahre	< 25 °C	Bei Pflanzenextrakten kann ein Niederschlag entstehen, der jedoch ohne Einfluss auf die Wirksamkeit ist.
<i>Montmorency Kirsch - Liquidum</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>2 Monate</i>	<i>< 25 °C</i>	
Monuril 3 g - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Kein heißes Wasser verwenden.
Motilium 1 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Movicol - Liquid Orange	nach Anbruch	30 Tage	< 25 °C	Flasche nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
	nach Zubereitung	24 Stunden	< 25 °C	Hergestellte Lösung zugedeckt aufbewahren.
Movicol - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einn. Junior aromafrei 6,9 g	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Gebrauchsfertige Lösung verschlossen aufbewahren.
Movicol - Pulver	nach Zubereitung	6 Stunden	2 - 8 °C	Abgedeckt lagern.
Moviprep - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	24 Stunden	< 25 °C	Die Lösung kann im Kühlschrank zugedeckt aufbewahrt werden.
Moviprep Orange - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	24 Stunden	< 25 °C	Die Lösung kann im Kühlschrank zugedeckt aufbewahrt werden.
Mucobene 200 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Mucobene 600 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Mucobene 600 mg - lösliches Pulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Mucokehl D5 - Tropfen zum Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht mehr verwenden.
Mucomat Hustenstiller 2,13 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Mucoplant Hustensaft Efeu - Sirup	nach Anbruch	6 Wochen	< 25 °C	
Mucoplant Hustensaft Efeu forte - Sirup im Beutel	nach Anbruch	sofort einnehmen		Beutel vor Gebrauch leicht durchkneten.
Mucor mucedo Sanum D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht mehr verwenden.
Mucosolvan 7,5 mg/1 ml Schleimlöser - Lösung	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Mucosolvan 30 mg/5 ml Schleimlöser - Saft	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Mucosolvan Kinder 15 mg/5 ml - Saft	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Mucospas - Saft	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Multivit D3 Baby - Lösung	nach Anbruch	12 Monate	15 - 25 °C	
Multivit DK - Lösung	nach Anbruch	12 Monate	15 - 25 °C	
Multi-Vitamin Energetikum Salus - Saft	nach Anbruch	8 Wochen	2 - 8 °C	Aufrecht lagern. Vor Gebrauch schütteln.
Mund- u. Halsentzündungen Similasan - Spray	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Mutaflor - Susp	nach Anbruch des Sachet	3 Monate	2 - 8 °C	Die Ampullen eines angebrochenen Sachets sind weiterhin im Kühlschrank im Sachet aufzubewahren.
	nach Anbruch der Ampulle	sofort einnehmen		
Mycostatin - orale Suspension	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch gut schütteln.
Naprotliquid 50 mg/ml - Susp z.Einn.	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Die Flasche vor Gebrauch kräftig schütteln.
Naproxen Infectopharm 50 mg/ml - Susp z.Einn.	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Naproxen InfectoPharm Saft - 250 mg/5 ml - Susp z.Einn.	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Natriumoxybat Kalceks 500 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	90 Tage	< 25 °C	
	nach Zubereitung	24 Stunden	< 25 °C	
Natriumoxybat neuraxpharm 500 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	7 Wochen	< 25 °C	
	nach Zubereitung	24 Stunden	< 25 °C	
Nefrocarnit 1 g/3,3 ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Neo Citran - Plv f.Erwachsene	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Neobrufen 400 mg - Brausegranulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Neoclarityn 0,5 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Nicht einfrieren.

Neoimmun 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank aufbewahren. Idealerweise ist die Lösung bei 20 °C bis 25 °C aufzubewahren. Bei Lagerung unter 20 °C können Schlieren und Flocken entstehen, welche bei 25 °C verschwinden. Die Wirksamkeit und Dosiergenauigkeit wird durch ev. weiter bestehende kleine Flocken nicht beeinträchtigt.
Nexium 10 mg - magensaftresist. Gran z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	
Niconex 1 mg/Sprühs. - Spray z.Anw. i.d.Mundhöhle	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Nicorette Spray Fruit+Mint 1 mg/Sprühst. - Spray z.Anw. i.d.Mundhöhle	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 30 °C	
Nicorette Spray Mint 1 mg/Sprühst. - Spray z.Anw. i.d.Mundhöhle	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 30 °C	
Nigersan D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trüb und flockig aussieht, nicht verwenden.
Nitrolingual 0,4 mg - Pumpspray	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Norit Carbomix 50 g - Gran z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	3 Tage	2 - 8 °C	
Normhydral - lösliches Pulver	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Mischungsverhältnis genau einhalten.
Normolyt - lösliches Pulver f.Kinder	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Pulver nicht unverdünnt einnehmen. Mischungsverhältnis genau einhalten.
Norvir 100 mg - Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	2 Stunden	< 30 °C	
Notakehl D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Nicht mehr verwenden, wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht.
Notta - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Schwankungen im Geruch sowie leichte Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität bzw. Wirksamkeit.
Novalgin - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Noxafil 40 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	4 Wochen	< 25 °C	Nicht einfrieren.
Noxafil 40 mg/ml - Susp z.Einnehmen (Par.Abacus)	nach Anbruch	4 Wochen	< 25 °C	Nicht einfrieren.
Noxafil 40 mg/ml - Susp z.Einnehmen (Par.Haemato)	nach Anbruch	4 Wochen	< 25 °C	Nicht einfrieren.
Noxafil 300 mg - magensaftres. Plv+Lsgm z.Herst. e.Susp z.Einn.	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	
Nozinan 4% - Tropfen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Nr. 1 - Verdauungs-, Galle- und Lebertropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 2 - Wirbelsäulen- und Gelenktropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 3 - Nieren- und Blasetropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 4 - Beruhigungs- und Schlaftropfen z.Einn. f.Kinder "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 5 - Bettnässertropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 6 - Heuschnupfentropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 7 - Bronchialtropfen z.Einn. f.Kinder "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 8 - Blasetropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 9 - Tropfen z.unspez. Abwehrsteigerung z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 10 - Sklerosetropfen "Mag. Doskar"	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Nr. 11 - Migränetropfen z.Einn. f.Frauen "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 12 - Migränetropfen z.Einn. f.Männer "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 13 - Nerventropfen z.Einn. f.Männer "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 14 - Nerven- und Examentropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	

Nr. 15 - Herz- und Kreislauftropfen mild z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 16 - Herz- und Kreislauftropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 17 - Schultropfen z.Einn. f.Jugendliche "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 18 - Frauentropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 19 - Aknetropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 20 - Grippetropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 21 - Halstropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 22 - Stärkungstropfen z.Einn. f.Kinder "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 23 - Prostatatropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 24 - Hustentropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 25 - Verletzungstropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 26 - Nebenhöhlen-Tropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 27 - Stoffwechselftropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 28 - Venentropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 29 - Neuralgietropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 30 - Schlaf tropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 31 - Schwindeltropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 32 - Neurasthenietropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 33 - Entwöhnungstropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 34 - Stärkungstropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 35 - Reizblasentropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 36 - Tropfen bei Regelbeschwerden z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 37 - Magen- u. Verdauungsstörungstropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 38 - Durchfalltropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 39 - Durchblutungstropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nr. 40 - Gelenksentzündungstropfen z.Einn. "Mag. Doskar"	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Nureflex - orale Susp f.Kinder 20 mg/ml	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Nureflex Junior Erdbeer 40 mg/ml - Susp z.Einn.	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Nureflex Junior Orange 40 mg/ml - Susp z.Einn.	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Nux Vomica-Homaccord - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Octenidin Schülke + Mayr 1 mg/ml - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch der Flasche mit 60 ml	2 Wochen	< 25 °C	
	nach Anbruch der Flasche mit 250 ml	8 Wochen	< 25 °C	
Octenidin Schülke 1 mg/ml - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch der Flasche mit 60 ml	2 Wochen	< 25 °C	
	nach Anbruch der Flasche mit 250 ml	8 Wochen	< 25 °C	

Octenimed 1 mg/ml - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch der Flasche mit 60 ml	2 Wochen	< 25 °C	
	nach Anbruch der Flasche mit 250 ml	8 Wochen	< 25 °C	
Ökopharm Gedächtnis - Saft	nach Anbruch	4 Wochen	2 - 8 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Ökopharm Immun 44 - Saft	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Ökopharm L-Lysin Lippen - Saft	nach Anbruch	4 Wochen	2 - 8 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Oleovit D3 - Tropfen	nach Anbruch	10 Monate	< 25 °C	
Oleovital D3+K2 - 1000 IE + 100 µg Kirsche - Mundspray	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Opsonat spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Opsumit 2,5 mg - Tabletten z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung in Flüssigkeiten mit Raumtemperatur (mit Löffel oder im Glas)	sofort einnehmen		Die Hände müssen vor und nach der Zubereitung gründlich gewaschen und abgetrocknet werden.
Oramorph - Lsg z.Einn. 2 mg/ml	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Oramorph 20 mg/ml - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Orfadin 4 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Nicht einfrieren. Aufrecht aufbewahren. Vor Gebrauch kräftig schütteln.
Orgafem - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Original Schwedenbitter Riviera - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Trübung beeinträchtigt nicht die Wirkung.
Orkambi 75 mg/94 mg- Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde	< 25 °C	
Orkambi 100 mg/125 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde	< 25 °C	
Orkambi 150 mg/188 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	1 Stunde	< 25 °C	
Osanit Zahnnungstropfen zum Einnehmen	nach Öffnen	90 Minuten		1,5 Stunden nach dem Öffnen der Ampulle darf der Inhalt nicht mehr eingenommen werden.
Ospamox 250 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Ospen 400 - Saft	nach Anbruch	14 Tage	2 - 8 °C	
Ospen 750 - Saft	nach Anbruch	14 Tage	2 - 8 °C	
Ossop - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Oss-regen spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Otovowen - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Oxygerolan 1 mg/ml- Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Oxygerolan 10 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Ozased 2 mg/ml - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Palexia 20 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Wochen	< 25 °C	Die Flasche in aufrechter Position stehend lagern.
Paracetamol Basi 40 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Paracodin - Tropfen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Pascofemin - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Pasconal - Nerventropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Passedan - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Nachtrübungen haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.
Passionsblumenkraut Rat + Tat - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Nachtrübungen haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit. Leichte Schwankungen in Farbe und Geschmack können vorkommen.
Pefrakehl D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Pekana Erschöpfungszustände spag. Peka - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Pelargonium Phytopharm - Sirup	nach Anbruch			
Pelargonium Phytopharm - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Pelargonium Schwabe - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Peloide - Tropfen	nach Anbruch	6 Wochen	< 30 °C	
Petinimid - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Pheburane 350 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	4 Wochen	< 25 °C	
Phönix Antitox - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	

Phönix Argentum - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	
Phönix Ferrum - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Phönix Hydrargyrum - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Phönix Lymphophön - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Phönix Phönhepan - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Phönix Plumbum - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Phönix Solidago - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Phytodolor - Rheumatropfen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln. Ausflockungen oder leichte Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität.
Picoprep - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Öffnen des Beutels	sofort einnehmen		
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Falls die trübe Lösung warm wird, sollte solange gewartet werden, bis sie ausreichend abgekühlt ist.
Pilka Thymian - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Insbesondere bei Temperaturschwankungen können Eintrübungen auftreten. Diese beeinträchtigen die Wirkung nicht. Vor Gebrauch gut schütteln.
Piroxistad 20 mg Tabs - lösbare Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Pleinvue - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	24 Stunden	< 25 °C	Kann im Kühlschrank abgedeckt aufbewahrt werden.
Pneumodoron Nr. 1 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Pneumodoron Nr. 2 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Posaconazol AHCL 40 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	30 Tage	< 25 °C	
Posaconazol Stada 40 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	30 Tage	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren.
Potaba Glenwood 3 g - Pulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Gut gekühlt einnehmen.
Pradaxa 20 mg - überzogenes Granulat	nach Anbruch des Aluminiumbeutels	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das überzogene Granulat ist nicht mit Milch oder Milchprodukten kompatibel.
Pradaxa 30 mg - überzogenes Granulat	nach Anbruch des Aluminiumbeutels	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das überzogene Granulat ist nicht mit Milch oder Milchprodukten kompatibel.
Pradaxa 40 mg - überzogenes Granulat	nach Anbruch des Aluminiumbeutels	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das überzogene Granulat ist nicht mit Milch oder Milchprodukten kompatibel.
Pradaxa 50 mg - überzogenes Granulat	nach Anbruch des Aluminiumbeutels	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das überzogene Granulat ist nicht mit Milch oder Milchprodukten kompatibel.
Pradaxa 110 mg - überzogenes Granulat	nach Anbruch des Aluminiumbeutels	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das überzogene Granulat ist nicht mit Milch oder Milchprodukten kompatibel.
Pradaxa 150 mg - überzogenes Granulat	nach Anbruch des Aluminiumbeutels	6 Monate	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das überzogene Granulat ist nicht mit Milch oder Milchprodukten kompatibel.
Precifit 5 mg/1,25 mg - Tabl z.H.e. Susp z.Einn. Dosiergerät	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
	nach dem Entfernen des Folienbeutels	2 Monate	< 30 °C	
Prezista 100 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 30 °C	Vor Gebrauch kräftig schütteln. Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren. Keiner starken Hitze aussetzen.
Proal spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Prometax 2 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Monat	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Aufrecht stehend aufbewahren.

Prontobario HD Magenkontrast. hochkonz. 334,74 g - Plv z.H.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Proscenat spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Prosfartil - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Prospan - Hustensaft	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Prospan - Hustentropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Leichte Trübungen, Ausflockungen oder geringfügige Geschmacksveränderungen haben keinen Einfluss auf die Qualität.
Prospan akut - Brausetabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Prospan Hustenliquid - Flüssigkeit z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Prostata Gastreu R25 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Psta spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Psychopax - Tropfen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Pumpen - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Schwankungen im Geruch sowie leichte Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität bzw. Wirksamkeit.
Pyravex pur - Lsg z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Qaialdo 10 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	12 Wochen	< 25 °C	
Quantalan zuckerfrei - Pulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Quentakehl D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Wenn die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Quexima 25 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	120 Tage	< 30 °C	Flasche vor Gebrauch 15 Sekunden lang schütteln.
Rapamune 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch der Flasche	30 Tage	2 - 8 °C	
	nach Anbruch der Flasche oder in der Applikationsspritze	24 Stunden	< 25 °C	
	nach Verdünnung	sofort einnehmen		
Ravicti 1,1 g/ml - Flüssigkeit z.Einnehmen	nach Anbruch	14 Tage	< 25 °C	
Recarcin D6 - Tropfen zum Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Recigar 1,5 mg/Dosis - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nicht einfrieren oder im Kühlschrank aufbewahren.
Relax Nerven - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Remens - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Schwankungen im Geruch sowie leichte Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität bzw. Wirksamkeit.
Reminyl 4 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Nicht einfrieren.
Renelix spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Renvela 0,8 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Öffnen des Beutels	24 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das Pulver darf nicht erhitzt werden (z.B. Mikrowelle).
Renvela 1,6 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Öffnen des Beutels	24 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das Pulver darf nicht erhitzt werden (z.B. Mikrowelle).
Renvela 2,4 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Öffnen des Beutels	24 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das Pulver darf nicht erhitzt werden (z.B. Mikrowelle).
Renvela 2,4 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn. (Par.Abacus)	nach Öffnen des Beutels	24 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das Pulver darf nicht erhitzt werden (z.B. Mikrowelle).
Restaxil - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Resyl mit Codein - Tropfen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	

Retrovir 100 mg/10 ml - Saft	nach Anbruch	1 Monat	< 30 °C	
Revolade 25 mg - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	30 Minuten		Nach Rekonstitution sollte das Arzneimittel unmittelbar angewendet werden, kann aber auch über einen Zeitraum von maximal 30 Min. aufbewahrt werden.
Reyataz 50 mg - Plv z.Einnehmen	nach Zubereitung	1 Stunde	< 30 °C	
Ricura spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Rifoldin - Sirup	nach Anbruch	30 Tage	< 25 °C	
Riopan 1600 mg - MagenGel	nach Anbruch	sofort einnehmen		Nicht einfrieren. Vor Gebrauch kräftig schütteln.
Riopan 800 mg - orale Suspension	nach Anbruch	sofort einnehmen	< 25 °C	Nicht einfrieren.
Risperdal 1 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Risperdal 1 mg/ml - Lsg z.Einn. (Par. P3/P4)	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Risperdal 1 mg/ml - Lsg z.Einn. (Par. P6)	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Risperdal 1 mg/ml - Lsg z.Einn. (Par.P5)	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Risperdal 1 mg/ml - Lsg z.Einn. (Par.P7)	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Rivastigmin 1A Pharma 2 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	1 Monat	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Aufrecht stehend aufbewahren.
Rivastigmin Hexal 2 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	1 Monat	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Aufrecht stehend aufbewahren.
Rivastigmin Sandoz 2 mg/ml - Lsg z.Einn.	nach Anbruch	1 Monat	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern oder einfrieren. Aufrecht stehend aufbewahren.
Rixx - Schlankheitstropfen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Rotarix - Susp z.Einn. Fertigapplikator f. orale Verabr.	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Rotarix - Susp z.Einn. Multi-Monodos. Tuben z.Ausdrücken	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Rotarix - Susp z.Einn. Tube z.Ausdrücken	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Rotateq - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Rowachol - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Rubaxx - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Rubaxx Arthro - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Mit der Zeit kann eine leichte Trübung und/oder ein leichter Niederschlag mit lose schwebenden Partikeln auftreten. Vor Gebrauch schütteln.
Rubaxx Plus - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Ruberkehl D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Rupafin 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	30 Monate	< 25 °C	
Rybitra 160 µg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	28 Tage	< 25 °C	
Ryt mopasc - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Bei Trübungen und Ausflockungen Flasche kurz aufschütteln.
Sab Simplex - Tropfen	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	
Sabril 500 mg - lösliches Pulver	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Salviaforce mit Echinacea - Spray z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Sandimmun-Neoral 100 mg/ml - Trinklösung	nach Anbruch	2 Monate	< 30 °C	Aufbewahrung zwischen 15 °C und 30 °C, vorzugsweise nicht unter 20 °C über einen längeren Zeitraum, da es zu einer Gelbildung kommen kann, die jedoch bei Lagerung vor Verwendung bei Temperaturen bis zu 30 °C reversibel ist. Leichte Flocken oder Ablagerungen haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit und die Sicherheit. Die Dosiergenauigkeit mittels der Pipette bleibt erhalten.
Sangenor - Trinkampullen	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Sankombi D5 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.

Sanukehlbrucel D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanukehlcand D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanukehlcoli D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanukehlklebs D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanukehlmyc D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanukehlpseu D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanukehlstaph D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanukehlstrep D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanuvis - Tropfen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sanuvis D2 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Lösung nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Sapropterin Dipharma 100 mg - Tabl z.H.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung (Tabletten können zum schneller Auflösen zerkleinert werden)	20 Minuten	< 25 °C	Lösung innerhalb von 15 bis 20 Minuten trinken. Kleine sichtbare Partikel beeinträchtigen nicht die Wirksamkeit.
Sapropterin Dipharma 100 mg - Plv z.H.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	
Sapropterin Dipharma 500 mg - Plv z.H.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	
Sativex - Spray z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	42 Tage	< 25 °C	Aufrecht lagern.
Scannotrast - Konz f. orale u. rektale Suspension	nach Zubereitung	sofort verwenden		Vor Gebrauch gut schütteln.
Schönenberger Mistel - Saft	nach Anbruch	2 Wochen	2 - 8 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Schönenberger Weissdorn - Saft	nach Anbruch	2 Wochen	2 - 8 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Scottopect - Hustensaft	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Selenase 100 µg/2 ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Selenase 500 µg/10 ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Seonsil spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Sephience 250 mg - Plv z.Einnehmen i.Beutel	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	
	nach Zubereitung	6 Stunden	< 25 °C	
Sephience 1000 mg - Plv z.Einnehmen i.Beutel	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	
	nach Zubereitung	6 Stunden	< 25 °C	
Seractil akut 300 mg - Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Seractil akut 400 mg - Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Sevelamercarbonat Winthrop 0,8 g - Plv z.H.e. Susp z.Einn.	nach Öffnen des Beutels	24 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das Pulver darf nicht erhitzt werden (z.B. Mikrowelle).
Sevelamercarbonat Winthrop 2,4 g - Plv z.H.e. Susp z.Einn.	nach Öffnen des Beutels	24 Stunden	< 25 °C	
	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	Das Pulver darf nicht erhitzt werden (z.B. Mikrowelle).
Sialanar 320 µg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Sialin-Sigma - Lösung	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Similasan Heuschnupfen - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Husten - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Insektenstiche - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	

Similasan Kopfweh - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Kreislaufbeschwerden - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Leber-Galle-Beschwerden - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Milchbildungstropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Nerventropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan nervöse Herzbeschwerden - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Nieren-Blasen-Beschwerden - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Periodenbeschwerden - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Reizhusten u.trockener Husten - Tropfen z.Einn.	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Rheuma und Gicht - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Schlaf- und Entspannungstropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan starkes Schwitzen - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Wechseljahrsbeschwerden - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Similasan Wetterfühligkeit - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Sinudoron - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Sinupas - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Sinupret - Saft	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Leichte Trübung oder Ausflockung beeinträchtigt nicht die Qualität.
Sinupret - Saft sine	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Leichte Trübung oder Ausflockung beeinträchtigt nicht die Qualität.
Sinupret - Tropfen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Leichte Trübung oder Ausflockung beeinträchtigt nicht die Qualität.
Solcoseryl 2,125 mg/g + 10 mg/g - Dentalpaste	nach Anbruch	28 Tage	< 30 °C	In der Originalverpackung aufbewahren, um den Inhalt vor Licht zu schützen.
Somcupin spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Speciol spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Spexotras 0,05 mg/ml - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einnehmen	nach Zubereitung	35 Tage	< 25 °C	Nicht einfrieren. In der Originalverpackung aufbewahren.
Sprycel 10 mg/ml - Plv z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	60 Tage	2 - 8 °C	Nicht einfrieren. Vor Gebrauch gut schütteln.
	nach Zubereitung	1 Stunde	< 25 °C	
Strattera 4 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	45 Tage	< 25 °C	
Strephestan Efeu - Hustenlöser Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Strephestan Spitzwegerich - Hustenreizlinderer Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Bodensatz bei Lagerung hat keinen Einfluss auf die Qualität des Produkts.
Strepsils 8,75 mg/Dosis - Spray z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren
Strepsils 8,75 mg/Dosis Honig+Zitr. - Spray z.Anw. i.d. Mundhöhle	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Nicht einfrieren.
Sucontral - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	7 Monate	< 25 °C	Eine Trübung beeinträchtigt nicht die Wirkung.
Sucralan 1 g/5 ml - orale Suspension	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Sucralfat Genericon 1 g/5 ml - orale Suspension	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Sultanol - Saft	nach Anbruch	14 Tage	< 30 °C	
Supamun immun Power - Nektar	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	Vor Licht und Sonneneinstrahlung schützen.
Symbioflor E. coli - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	4 Wochen	2 - 8 °C	
Symbioflor Enterococcus - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	4 Wochen	2 - 8 °C	
Syntroxine SOL 13 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	

	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 25 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 50 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 75 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 88 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 100 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 112 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 125 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 137 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 150 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 175 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Syntroxine SOL 200 µg - Lsg z.Einn. im Einzeldosisbeh.	nach Öffnen des Beutels	15 Tage	< 25 °C	
	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Taloxa 600 mg/5 ml - orale Suspension	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	
Tantum Grip Orange 600 mg/10 mg - Plv im Btl z.H.e. Lsg z.Einn.	nach Anbruch	sofort einnehmen		
Tantum Grip Zitr.+Honig 600 mg/10 mg - Plv im Btl z.H.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Tantum Grip Zitrone 600 mg/10 mg - Plv im Btl z.H.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Tantum Verde - Lsg z.Gurgeln	nach Anbruch der Flasche ohne Dosierpumpe	ganze Laufzeit	< 25 °C	Vor direktem Sonnenlicht schützen.
	nach Anbruch der Flasche mit Dosierpumpe	3 Monate	< 25 °C	Vor direktem Sonnenlicht schützen.
Tantum Verde - Mundspray	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Tantum Verde forte - Mundspray	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Tantum Verde Protect 1,5 mg/ml + 5 mg/ml - Spray z.Anw. i.d.Mundhöhle	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	

Tartephedreel - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Tavituss - Hustensirup	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Tebofortan 4 % - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Tegretol - orale Suspension	nach Anbruch	3 Monate	< 30 °C	
Teicoplanin Altan 200 mg - Plv z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Altan 400 mg - Plv z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Hikma 100 mg - Plv z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Hikma 200 mg - Plv z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Hikma 400 mg - Plv z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Mylan 100 mg - Plv z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Mylan 200 mg - Plv z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Mylan 400 mg - Plv z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Noridem 200 mg - Plv+Lsgm z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Noridem 400 mg - Plv+Lsgm z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Sandoz 100 mg - Plv+Lsgm z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Sandoz 200 mg - Plv+Lsgm z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Teicoplanin Sandoz 400 mg - Plv+Lsgm z.H.e. Inj-/Inf-Lsg od. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	24 Stunden	2 - 8 °C	Aus mikrobiologischer Sicht sollte die Zubereitung sofort verwendet werden.
Telzir 50 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	28 Tage	< 25 °C	Nicht einfrieren.
Tivicay 5 mg - Tabl z.Herst.e. Susp z.Einnehmen	nach Zubereitung	30 Minuten		Wenn mehr als 30 Minuten vergangen sind, sollte die Dosis verworfen und eine neue Dosis zubereitet werden.
Toex spag. Peka - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Tonginal - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Schwankungen im Geruch sowie leichte Trübungen haben keinen Einfluss auf die Qualität und Wirksamkeit.
Tonsillol - Gurgellösung	nach Öffnen	1 Jahr	< 25 °C	Das Behältnis im Umkarton aufbewahren (Lichtschutz).
Tonsillopas - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Tonsipret - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Toxiloges - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Tracleer 32 mg- Tabl. z.Herst.e.Susp z.Einn.	verbleibende, geteilte Tablette zur Zubereitung	7 Tage	< 25 °C	
	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Traditionelle Retterspitz - Susp mit Thymianöl z.Einn.	nach Anbruch	12 Wochen	2 - 8 °C	
Tradolan - Tropfen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Tramabene - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Tramadol 1A Pharma 100 mg/ml - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Tramadolhydrochlorid G.L. - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	Packung stehend lagern.
Tramador 100 mg/ml - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Tramal- Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Tramastad 100 mg/ml - Tropfen	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Traumeel - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	

Trileptal 60 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	7 Wochen	< 25 °C	
Triumeq 5 mg/60 mg/30 mg - Tabl z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	30 Minuten	< 25 °C	
Tuscalman - Hustensirup	nach Anbruch	3 Wochen	< 25 °C	
Tussamag - Hustensaft zuckerfrei	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	
Tussamag - Hustensirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Tussastopp - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Tussimont - Hustensaft mit Thymian u.Senegawurzel	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Tussimont - Hustentropfen mit Thymian u.Spitzwegerich	nach Anbruch	1 Jahr	< 25 °C	Ein Niederschlag hat keinen Einfluss auf die Wirksamkeit.
<i>Tussimont Junior - Honigsirup</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>3 Monate</i>	< 25 °C	
Ucedane 200 mg - Tabletten z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Uralyt U - Granulat	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Ursofalk 250 mg/5 ml - orale Susp	nach Anbruch	4 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Utilinphlei D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Utilisubt D6 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	8 Wochen	< 25 °C	Wenn die Flüssigkeit nicht mehr klar, sondern trübe und flockig aussieht, nicht verwenden.
Vasa-Gastreu R36 - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Vaxchora - Brausepulver + Plv z.H.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	15 Minuten	< 25 °C	
Vedrop 50 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	
Velphoro 125 mg - Plv z.Einnehmen, im Beutel	nach Zubereitung	30 Minuten		Wenn nötig, sollte die Suspension vor der Einnahme erneut umgerührt werden.
Veltassa 1 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	1 Stunde	< 25 °C	
Veltassa 8,4 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	1 Stunde	< 25 °C	
Veltassa 16,8 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	1 Stunde	< 25 °C	
Veltassa 25,2 g - Plv z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	1 Stunde	< 25 °C	
Vendal 5 mg/ml - orale Lösung	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Venodril - Tropfen z.Einnehmen, Flüssigkeit	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Venoruton 1000 mg - Plv z.Herst.e. Lsg z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Vertigoheel - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Vertirosan - Tropfen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Vesicare 1 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	28 Tage	< 25 °C	
Vibramycin 50 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung mit Wasser (keine Milch/Milchprodukte)	sofort einnehmen		In aufrechter Position und nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen einnehmen (Gefahr einer Schleimhautschädigung im Ösophagus).
Vibramycin 100 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung mit Wasser (keine Milch/Milchprodukte)	sofort einnehmen		In aufrechter Position und nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen einnehmen (Gefahr einer Schleimhautschädigung im Ösophagus).
Vibramycin 200 mg - lösbare Tabletten	nach Zubereitung mit Wasser (keine Milch/Milchprodukte)	sofort einnehmen		In aufrechter Position und nicht unmittelbar vor dem Schlafengehen einnehmen (Gefahr einer Schleimhautschädigung im Ösophagus).
Viburcol-Phioten - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch des Sachets	6 Monate	< 25 °C	
	nach Anbruch der Phiole	sofort einnehmen		Die angebrochene Phiole nur am Tag des Öffnens verwenden.
Vi-De3 - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Vimpat 10 mg/ml - Sirup	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern.
Vimpat 10 mg/ml - Sirup (Par.Abacus)	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nicht im Kühlschrank lagern.
Vinceel - Halsspray	nach Anbruch	6 Monate	< 30 °C	
Viramune 50 mg/5 ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
<i>VitAgil Vital - Elixier</i>	<i>nach Anbruch</i>	<i>3 Monate</i>	< 25 °C	
Vitavitan D 25000 I.E. - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	sofort einnehmen		Vor Gebrauch gut schütteln.
	nach Zubereitung (gemischt mit kleiner Menge kalter oder lauwarmer Nahrung)	sofort einnehmen		Vor Gebrauch gut schütteln.

Vitavitan D 50000 I.E. - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	sofort einnehmen		Vor Gebrauch gut schütteln
	nach Zubereitung (gemischt mit kleiner Menge kalter oder lauwarmer Nahrung)	sofort einnehmen		Vor Gebrauch gut schütteln.
Vitrakvi 20 mg/ml - Lsg z.Einn. (003)	nach Anbruch	30 Tage	2 - 8 °C	nicht einfrieren
Vitrakvi 20 mg/ml - Lsg z.Einn. (004)	nach Anbruch	10 Tage	2 - 8 °C	nicht einfrieren
Vomitushel - Tropfen z.Einnehmen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Voquily 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	
Votubia 1 mg - Tabletten z.H.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Wenn die Zubereitung nicht innerhalb von 30 Min. bei Verwendung einer Applikationsspritze bzw. 60 Min. bei Verwendung eines kleinen Glases eingenommen wird, ist die Suspension zu verwerfen und muss neu zubereitet werden.
Votubia 1 mg - Tabletten z.H.e. Susp z.Einn. (Par.Synco)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Wenn die Zubereitung nicht innerhalb von 30 Min. bei Verwendung einer Applikationsspritze bzw. 60 Min. bei Verwendung eines kleinen Glases eingenommen wird, ist die Suspension zu verwerfen und muss neu zubereitet werden.
Votubia 2 mg - Tabletten z.H.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Wenn die Zubereitung nicht innerhalb von 30 Min. bei Verwendung einer Applikationsspritze bzw. 60 Min. bei Verwendung eines kleinen Glases eingenommen wird, ist die Suspension zu verwerfen und muss neu zubereitet werden.
Votubia 3 mg - Tabletten z.H.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung.	sofort einnehmen		Wenn die Zubereitung nicht innerhalb von 30 Min. bei Verwendung einer Applikationsspritze bzw. 60 Min. bei Verwendung eines kleinen Glases eingenommen wird, ist die Suspension zu verwerfen und muss neu zubereitet werden.
Votubia 5 mg - Tabletten z.H.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Wenn die Zubereitung nicht innerhalb von 30 Min. bei Verwendung einer Applikationsspritze bzw. 60 Min. bei Verwendung eines kleinen Glases eingenommen wird, ist die Suspension zu verwerfen und muss neu zubereitet werden.
Votubia 5 mg - Tabletten z.H.e. Susp z.Einn. (Par.Orifarm)	nach Zubereitung	sofort einnehmen		Wenn die Zubereitung nicht innerhalb von 30 Min. bei Verwendung einer Applikationsspritze bzw. 60 Min. bei Verwendung eines kleinen Glases eingenommen wird, ist die Suspension zu verwerfen und muss neu zubereitet werden.
Vulpur spag. Peka - Tropfen	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Weissdorn Rat u. Tat - Flüssigkeit z.Einn.	nach Anbruch	6 Monate	< 25 °C	Nachtrübungen haben keinen Einfluss auf die Wirksamkeit, leichte Schwankungen in Farbe und Geschmack können vorkommen.
Wick 200 mg/15 ml Hustenlöser-Sirup	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Wick Formel 44 Hustenstiller - Sirup 20 mg/15 ml	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Wick Formel 44 Hustenstiller - Sirup mit Honig 20 mg/15 ml	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Wick MediNait Erkältungssirup f.d. Nacht	nach Anbruch	4 Jahre	< 25 °C	
Xaluprine 20 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	56 Tage	< 25 °C	
Xaluprine 20 mg/ml - Susp z.Einnehmen (Par.Haemato)	nach Anbruch	56 Tage	< 25 °C	
Xeljanz 1 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	60 Tage	< 25 °C	
Xiclav Quicktab 625 mg - Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Xiclav Quicktab 1 g - Tabletten	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Xofluza 2 mg/ml - Gran z.Herst.e. Susp z.Einn.	nach Zubereitung	10 Stunden	< 30 °C	
Xofluza 10 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Xofluza 30 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	sofort einnehmen		

Xofluza 40 mg - Granulat im Beutel	nach Zubereitung	sofort einnehmen		
Xromi 100 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	12 Wochen	2 - 8 °C	
Xylonor - Spray	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Xyrem 500 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	90 Tage	< 25 °C	
	nach Zubereitung	24 Stunden	< 25 °C	
Zebinix 50 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch gut schütteln.
Zeffix - Lsg z. Einnehmen 5 mg/ml	nach Anbruch	1 Monat	< 25 °C	
Zeldox 10 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	Vor Gebrauch schütteln.
Ziagen 20 mg/ml - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	2 Monate	< 25 °C	
Zofran - Lsg z.Einnehmen	nach Anbruch	28 Tage	< 30 °C	Nicht im Kühlschrank lagern. Flasche aufrecht aufbewahren.
ZOM - Tropfen z.Einnehmen, Flüssigkeit	nach Anbruch	ganze Laufzeit	< 25 °C	
Zovirax 400 mg/5 ml - Saft	nach Anbruch	16 Tage	< 25 °C	
Zovirax 400 mg/5 ml - Saft (Par.P4)	nach Anbruch	16 Tage	< 25 °C	
Zovirax 400 mg/5 ml - Saft (Par.P6)	nach Anbruch	16 Tage	< 25 °C	
Ztalmy 50 mg/ml - Susp z.Einnehmen	nach Anbruch	30 Tage	< 25 °C	
Zyrtec 1 mg/ml - orale Lösung	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	
Zyrtec 10 mg/ml - Tropfen	nach Anbruch	3 Monate	< 25 °C	